NOTE XXXIII.

CLYTRIDE ET EUMOLPIDES NOUVEAUX DE L'AFRIQUE TROPICALE OCCIDENTALE, ET DES ILES DE SUMATRA ET DE BANKA.

DÉCRITS PAR

Ed. LEFÈVRE,

Ancien Président de la Société entomologique de France.

Clytra (Diapromorpha) cribricollis, spec. nov.

Subconico-cylindrica, nigra, subtus dense argenteo-sericea, palpis, antennis pedibusque omnino rufo-testaceis, mandibulis nigris, superne rufo-maculatis; capite subtiliter ruguloso, inter oculos late evidenter depresso, pube subargentea obsito; prothorace nigro, margine laterali et antico maculaque media parva, flavis, parte nigra antice late et profunde sinuata, punctato-corrugata, punctis majoribus et minoribus intermixtis; scutello punctulato, triangulari, apice acuto, linea media elevata longitudinaliter instructo; elytris grosse inordinatim punctatis, fasciis tribus transversis et undulatis (1a. basali obliqua, 2a. submedia, 3a. fere apicali) nigris. — Long. 11 mill.; lat. 5 mill.

Afrique trop. occ.: Humpata (v. d. Kellen). — Un seul exemplaire.

Cette belle espèce est voisine du *D. argentata* Fabr. Elle s'en distingue surtout par la couleur rouge des palpes, des antennes et des pattes, et par la partie noire du prothorax qui est couverte de gros points enfoncés mélangés de points plus petits. A la base et sur les côtés latéraux, ces points se réunissent les uns aux autres, ce qui fait paraître ces parties comme corrodées.

Pagria sumatrensis, spec. nov.

Breviter ovalis, subtus brunneo-testacea, supra fulva, elytris pedibusque dilutioribus; capite inter oculos foveolato, post oculos late et profunde canaliculato, vertice lævi, epistomate punctato, mandibulis oculisque nigris, palpis et antennarum articulis duobus primis albido-flavis, his apice fuscis; prothorace in medio disci leviter et remote, ad latera fortius et crebrius, punctato, margine laterali utrinque medio subacute angulato; scutello parvo, lævi, apice rotundato; elytris infra humeros subarcuatim impressis, leviter lineatim punctatis (punctis grossis, nigris, intra impressionem basalem profundioribus), sutura nigro-infuscata, callo humerali tumido, lævi, in costulam brevem longitudinaliter producto; femoribus subtus dente minutissimo instructis. — Long. 2 mill.; lat. 1 mill.

Sumatra or.: Tandjong Morawa, district de Serdang (Dr. B. Hagen). — Un seul exemplaire.

Note. Le *Nodostoma flavo-pustulatum*, du Japon, décrit par M. Baly (Trans. Ent. Soc. of London, 1874, p. 169), doit être rapporté au genre *Pagria*, dont il possède tous les caractères. Il en est de même du *Nodostoma consimile* du même auteur (loc. cit. p. 168). Cette dernière espèce n'est pas spéciale au Japon, car j'en possède deux exemplaires de Shanghai et un des environs de Saïgon. M. Jacoby (Proceed. Zool. Soc. of London, 1885, p. 752) la considère comme une simple variété du *Nodostoma flavo-pustulatum*.

Aulexis pallida, spec. nov.

Suboblonga, omnino cum palpis, antennis pedibusque pallide fulva, pilis albidis sat dense undique obtecta, capite, prothorace elytrisque creberrime subtiliter punctulatis; prothorace subcylindrico, superne depresso, utrinque pone medium oblique vix perspicue impresso, margine laterali ipso deleto, medio evidenter tridentato. — Long. 4 mill.; lat. $2^1/_4$ mill.

Sumatra or.: Boenga mas, Palembang (J. C. van Hasselt). — Un seul exemplaire.

Colasposoma mutabile, Baly.

(Trans. Ent. Soc. Lond. 3rd ser. Vol. IV (1867), p. 273).

Contrairement à l'opinion émise par M. Jacoby (Notes from the Leyden Museum, VI, 1884, p. 22), je pense que les nombreux exemplaires de *Colasposoma* provenant de Sumatra (de l'expédition-scientifique et du Dr. B. Hagen), doivent être rapportés au *C. mutabile* Baly et non au *C. nigriventre* Baly. Dans cette dernière espèce, en effet, la couleur de l'abdomen est constamment d'un noir foncé et mat, sans aucune trace du reflet bronzé, vert ou bleuâtre, que présente toujours l'abdomen du *C. mutabile*. De plus, dans les femelles du *C. nigriventre* les rugosités latérales des élytres sont beaucoup plus fortes et plus étendues que celles qu'on observe chez les femelles du *C. mutabile*.

Euryope cruciata, spec. nov.

Ovata, parum convexa, subtus cum antennis pedibusque nigra, illarum articulo primo apice rufescente, supra rubra, capite lato, subremote punctulato, inter oculos vage impresso, in media fronte macula nigra notato, mandibulis rubris, apice summo nigris; prothorace transverso; sat dense undique punctato, ad latera utrinque vage foveolato, maculis quatuor nigris insignito, margine laterali ipso recto; scutello nigro; elytris minute inordinatim undique punctatis, basi limbo communi latissimo (utrinque juxta scutellum interdum interrupto), et in singulo macula subtriangulari lata, ultra medium posita, nec latera, nec suturam, nec apicem attingente, nigris, callo humerali ipso rubro, postice in cretam brevem producto. — Long. $7^1/_2$—8 mill.; lat. 4—$4^1/_2$ mill.

Afrique trop. occ.: Ovumbo (Frank). — Quatre exemplaires.

Abirus Hageni, spec. nov.

Oblongus, convexus, subtus viridi-cyaneus, pube albida modice obtectus, supra viridi-metallicus, subaurato-reflexo-micans, nitidus, labro viridi, mandibulis oculisque nigris, palporum articulis basalibus fulvis, articulo ultimo cyaneo,

antennis dimidio corpore paulo longioribus, articulo primo viridi-metallico, quinque sequentibus cyaneis, subtus testaceis, reliquis cyaneis, dilatatis compressisque; capite punctulato, inter oculos vage transversim impresso, vertice convexo, utrinque post oculos leviter strigato; prothorace sat crebre aciculatim punctato; scutello subquadrato, lævi, apice rotundato; elytris infra humeros vix perspicue transversim impressis, utrinque juxta marginem lateralem longitudinaliter canaliculatis, disco interiori subtilissime subaciculatim, disco exteriori multo fortius, punctatis, interstitiis disci exterioris transversim strigatis; pedibus cyaneis, femoribus interdum viridi-reflexo-tinctis. — Long. $5^1/_3$—6 mill.; lat. 3 mill.

Sumatra or.: Tandjong Morawa, district de Serdang (Dr. B. Hagen). — Un seul exemplaire.

Apolepis atra, spec. nov.

Ovata, convexa, nigra, supra pilis squamæformibus erectis, apice arcuatis, instructa, labro antennisque basi obscure fusco-testaceis; prothorace grosse confertim punctato; elytris crebre sat fortiter punctatis, juxta suturam et versus apicem punctato-substriatis; pedibus nigris. — Long. $2^3/_4$—3 mill.; lat. $1^1/_2$—$1^3/_4$ mill.

Sumatra (René Oberthür). — Deux exemplaires.

Phytorus nigrolimbatus, spec. nov.

Ovalis, modice convexus, rufo-fulvus, nitidulus, antennis (articulis tribus primis exceptis) piceis, capite prothoraceque lævibus, illo inter oculos vage transversim impresso, hoc transverso, lateribus utrinque rotundato; scutello lævi; elytris longitudinaliter et regulariter striatis, striis dimidia parte antica tantum vix perspicue tenuiter punctulatis, limbo longitudinali latissimo nigro instructis, callo humerali ipso tumido, lævi; femoribus rufo-fulvis, anticis sicut et posticis subtus dente acuto parvo armatis; tibiis tarsisque nigris. — Long. $3^1/_2$—$3^3/_4$ mill.; lat. 2 mill.

Sumatra or.: Deli (J. A. N. Schagen van Leeuwen). — Un seul exemplaire.

Menius tarsalis, spec. nov.

Ovatus, convexiusculus, subtus niger, pectore viridi-æneo, supra viridi-æneus, nitidus, vage aurato-reflexo-micans, labro piceo, palpis antennisque fulvis, harum articulis quinque ultimis nigro-infuscatis; capite vix perspicue hic illic punctulato, inter oculos transversim evidenter impresso; prothorace lævi, in medio disci tantum remote punctato; scutello lævissimo; elytris infra humeros vage transversim impressis, regulariter punctato-striatis, callo humerali ipso lævi, calloso; pedibus viridi-æneis, femoribus omnibus subtus dente acuto armatis, tibiis apice tarsisque fuscis.

♂ Elytris punctato-striatis, interstitiis disci exterioris convexis subelevatisque; primo tarsorum anticorum articulo incrassato. — Long. $2^3/_4$—3 mill.; lat. $1^3/_4$ mill.

♀ Elytris punctato-striatis, interstitiis disci exterioris elevatis, costæformibus; primo tarsorum anticorum articulo simplici. — Long. 3—$3^1/_4$ mill.; lat. 2 mill.

Afrique trop. occ.: Liberia, Junk-river (Stampfli). — Deux exemplaires.

Cleorina fulvitarsis, spec. nov.

Ovata, convexa, subtus nigro-picea, supra obscure viridi-ænea, nitida, labro, palpis, antennis, tibiis apice tarsisque fulvis; prothorace antice sicut et postice lævi, in medio disci sat dense, ad latera utrinque crebrius et subconfluenter, profunde punctato, juxta marginem anticum transversim regulariter sulcato; scutello lævi, apice rotundato; elytris infra humeros utrinque sat fortiter arcuatim impressis, punctato-striatis, interstitiis lateralibus elevatis, costæformibus, parte basali inter suturam et callum humeralem evidenter tumida, callo humerali ipso prominente, lævi. — Long. 2—$2^1/_3$ mill.; lat. $1^1/_3$—$1^1/_2$ mill.

Sumatra or.: Tandjong Morawa, district de Serdang (Dr. B. Hagen). — Un seul exemplaire.

Note. *Cleorina æneo-micans* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1867, p. 237 (sub *Nodostoma*) = *Cl. aulica* Ed. Lef., Mém. Soc. Sc. de Liège. 2e Sér., tom. XI (1885), p. 144.

Corynodes egenus, spec. nov.

Breviter oblongus, convexus, viridi-metallicus, sub-auratomicans, aut viridi-cyaneus, nitidissimus, capite inter oculos profunde transversim sulcato, epistomate crebre fortiter, fronte remote et subtiliter, punctatis, hujus media parte longitudinaliter impressa, labro piceo, viridi-tincto, palpis magis minusve saturate fulvis, antennis elongatis, articulo 1°. metallico-viridi, 2—6 cyaneis, apice magis minusve fulvo-tinctis, 5 ultimis valde dilatatis, saturate violaceis; prothorace subconico, superne convexo, disperse modice punctato; scutello lævissimo, apice rotundato; elytris infra basin fortiter transversim impressis, subtiliter sublineatim punctulatis (punctis intra impressionem basalem paulo majoribus), infra callum humeralem utrinque tuberculo lævi instructis, callo humerali ipso tumido, lævi; pedibus viridi-cyaneis aut viridi-aurato-micantibus; unguiculis appendiculatis. — Long. 7 mill.; lat. 4 mill.

Sumatra or.: Tandjong Morawa, district de Serdang (Dr. B. Hagen). — Un seul exemplaire.

Colaspoides nigripes, Jacoby.

(Notes from the Leyden Museum, VI, 1884, p. 18).

Cette espèce, très-voisine du *C. Laportei* Baly, en diffère par la taille toujours d'un tiers au moins plus petite et par les rugosités des élytres plus fortes et moins serrées. Dans les individus typiques, le dessous du corps et les pattes sont noires, avec l'extrémité des tibias et les tarses d'un brun de poix plus ou moins clair. Mais cette coloration varie dans les proportions suivantes:

Var. β. Pectore nigro, abdomine nigro-cyaneo, femoribus viridi-metallico-tinctis.

Var. γ. Pectore, abdomine femoribusque viridi-metallicis, epipleuris nigris, tibiis apice tarsisque piceis, interdum piceo-brunneis.

Var. δ. Paulo minor, prothorace minus fortiter punctato, corpore subtus pedibusque viridi-metallicis, tarsis piceo-

brunneis. — Sumatra: Loeboe Gedang (Expédition de Sumatra). — Un seul exemplaire.

Colaspoides speciosa, spec. nov.

Suboblongo-ovata, modice convexa, subtus cyanea, supra metallico-aurata, roseo-cupreo-micans, fulgida, capite minute remote punctulato, inter oculos transversim fortiter impresso, labro, palpis antennisque brunneo-fulvis, his gracilibus, dimidio corpore paulo longioribus; prothorace transverso, fere triplo latiore quam longiore, minute parum dense punctulato, margine laterali utrinque subarcuato, concinne cyaneo; elytris infra humeros late transversim subimpressis, lineatim regulariter punctulatis, punctis intra impressionem basalem paulo majoribus, interstitiis versus apicem subelevatis, juxta marginem lateralem utrinque longitudinaliter concinne canaliculatis, limbo marginali ipso cyaneo; femoribus cyaneis, anticis et posticis subtus ultra medium dente valido triangulari armatis, tibiis tarsisque nigro-piceis. — Long. $8^1/_2$ mill.; lat. 4 mill.

Banka (Buddingh). — Un seul exemplaire.

Colaspoides Hageni, spec. nov.

Suboblongo-ovata, convexiuscula, subtus nigro-picea, supra ænea, magis minusve cupreo-aurato-reflexo-micans, interdum cyanea, prothorace elytrorumque margine laterali utrinque concinne viridi-metallico, labro rufo-brunneo, palpis antennarumque articulis 5 basalibus læte fulvis, harum articulis ultimis nigris; capite remote subfortiter punctato, inter oculos subarcuatim evidenter impresso, in media fronte profunde foveolato, juxta antennarum impressionem spatio lævi subcalloso utrinque notato; prothorace transverso, in medio disci subremote, ad latera utrinque crebrius et fortius punctato, punctis aciculatis; scutello lævi; elytris alutaceis, juxta suturam sublineatim, ad latera et versus apicem profunde punctato-striatis, punctis grossis, infra humeros subconfluentibus et rugas irregulares formantibus; pedibus

rufo-brunneis, magis minusve piceo-infuscatis, femoribus inermibus. — Long. 5—5$^1/_3$ mill.; lat. 2$^3/_4$—3 mill.

Sumatra or.: Tandjong Morawa, district de Serdang (Dr. B. Hagen). — Cinq exemplaires.

Colaspoides lævicollis, spec. nov.

Oblonga, convexa, subtus viridi-ænea, abdomine apice rufo-brunneo, supra viridi-metallica, aurato-reflexo-micans, nitida, capite vix perspicue minutissime punctulato, in media fronte longitudinaliter, inter oculos transversim, evidenter impresso, antennis gracilibus, dimidio corpore longioribus, articulis 5 basalibus fulvis, reliquis piceis, labro sicut et palpis fulvo-brunneis; prothorace transversim convexo, lævissimo, punctis tantum nonnullis grossis hic illic remotissime instructo; scutello lævi; elytris infra humeros late evidenter impressis, subfortiter (præsertim disco exteriori) puntatis, versus apicem punctato-substriatis; pedibus rufo-brunneis, femoribus omnibus viridi-metallico-tinctis, duobus anticis subtus medio subacute angulatis, duobus posticis subtus ultra medium dente validissimo subacuto armatis. — Long. 4$^1/_2$—4$^3/_4$ mill.; lat. 3—3$^1/_3$ mill.

Sumatra: Bedar Alam (Expédition de Sumatra). — Un seul exemplaire.

Var. β. Roseo-cupreo-metallica, nitidissima, corpore subtus, prothorace lateribus femoribusque viridi-aurato-reflexo-micantibus, tibiis tarsisque piceo-nigris.

Sumatra: Ajer Boesoek (Expédition de Sumatra). — Un seul exemplaire.